

Renseignements destinés aux patient·e·s

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

N^oKADIAN®

Capsules à libération prolongée de sulfate de morphine

Ces Renseignements destinés aux patient·e·s sont rédigés pour la personne qui prendra **KADIAN**. Il peut s'agir de vous ou d'une personne dont vous vous occupez. Lisez attentivement ces renseignements. Conservez-les, car vous devrez peut-être les relire.

Ces Renseignements destinés aux patient·e·s sont un résumé. Ils ne sont pas complets. Si vous avez des questions au sujet de ce médicament ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements au sujet de **KADIAN**, adressez-vous à un professionnel de la santé.

Encadré sur les « mises en garde et précautions importantes »

- **Même si vous prenez KADIAN comme on vous l'a prescrit, la prise de KADIAN est associée à un risque de dépendance aux opioïdes, d'abus et de mésusage qui peut entraîner une surdose et la mort. Pour comprendre votre risque de dépendance aux opioïdes, d'abus et de mésusage, vous devez parler à votre prescripteur (p. ex., un professionnel de la santé).**
- **Des problèmes respiratoires mettant la vie en danger peuvent survenir lors du traitement par KADIAN, surtout si les directives d'administration ne sont pas respectées. Les bébés sont à risque de présenter des problèmes mettant leur vie en danger si leur mère prend des opioïdes pendant sa grossesse ou pendant l'allaitement.**
- **Ne donnez jamais votre médicament KADIAN à une autre personne. Elle pourrait en mourir. Chez une personne à qui KADIAN n'a pas été prescrit, une seule dose peut causer une surdose mortelle. Cela est particulièrement vrai chez les enfants.**
- **Si vous avez pris KADIAN alors que vous étiez enceinte, que ce soit pour une courte ou une longue période et à une dose faible ou élevée, votre bébé peut présenter des symptômes de sevrage mettant sa vie en danger après la naissance. Cela peut survenir de la naissance jusqu'à quatre semaines après l'accouchement. Si votre bébé présente un ou plusieurs des symptômes suivants :**
 - **présente des changements dans sa respiration (comme une respiration faible, difficile ou rapide);**
 - **est inhabituellement difficile à réconforter;**
 - **a des tremblements;**
 - **présente une augmentation des selles, des éternuements des bâillements, des vomissements ou de la fièvre.**

Obtenez une assistance médicale immédiate pour votre bébé.

- **Prendre KADIAN avec d'autres médicaments opioïdes, des benzodiazépines, de l'alcool, ou d'autres déprimeurs du système nerveux central (y compris des drogues illicites) peut causer**

une somnolence sévère, une diminution de la vigilance, des problèmes respiratoires, un coma et la mort.

À quoi sert KADIAN :

KADIAN est utilisé pour la prise en charge à long terme de la douleur lorsque :

- la douleur est assez intense pour nécessiter de façon quotidienne la prise d'analgésiques agissant toute la journée;
- le professionnel de la santé détermine que les autres options de traitement ne sont pas efficaces pour soulager la douleur.

KADIAN N'EST PAS utilisé pour soulager une douleur qui survient de temps à autre (il n'est pas un analgésique « au besoin »).

Comment fonctionne KADIAN :

KADIAN est une capsule à libération prolongée à prise orale qui libère du sulfate de morphine lentement sur une période de 24 heures.

KADIAN contient du sulfate de morphine, qui est un médicament contre la douleur appartenant à la classe des médicaments appelés opioïdes, qui comprend aussi la codéine, le fentanyl et l'oxycodone. Il soulage la douleur en agissant sur des cellules nerveuses spécifiques de la moelle épinière et du cerveau.

Les ingrédients de KADIAN sont :

Ingrédients médicinaux : hémisulfate de morphine 2,5-hydraté

Ingrédients non médicinaux : copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) type A, éthylcellulose N-50, gélatine, hypromellose, phtalate de diéthyl, polyéthylène glycol 6000 (macrogol 6000), sphères de sucre, talc et encre noire contenant : hydroxyde d'ammonium, colorant E172 (oxyde de fer noir), hydroxyde de potassium, propylène glycol et gomme laque.

KADIAN se présente sous la ou les formes pharmaceutiques suivantes :

Capsules :

- 10 mg (portant l'inscription « K10 », et une bande noire)
- 20 mg (portant l'inscription « K20 », et deux bandes noires)
- 50 mg (portant l'inscription « K50 », et trois bandes noires)
- 100 mg (portant l'inscription « K100 », et quatre bandes noires)
- 200 mg (portant l'inscription « K200 », sans inscription sur le corps)

N'utilisez pas KADIAN dans les cas suivants :

- Votre professionnel de la santé ne vous l'a pas prescrit;
- Vous êtes allergique au pentahydrate de sulfate de morphine, à d'autres opioïdes ou à l'un ou l'autre des ingrédients de KADIAN. Rappelons que KADIAN contient du sucrose et du propylène glycol;

- Votre douleur est légère ou de courte durée et peut être soulagée par un usage occasionnel de médicaments contre la douleur, y compris ceux vendus sans ordonnance;
- Vous souffrez d'asthme grave ou avez de la difficulté à respirer ou d'autres problèmes pulmonaires;
- Vous avez une affection qui fait que votre intestin grêle ne fonctionne pas comme il faut (iléus paralytique) ou vous avez une douleur sévère dans l'abdomen;
- Vous avez une maladie de la vésicule biliaire ou des voies biliaires ou des problèmes de pancréas;
- Vous avez une blessure à la tête;
- Vous êtes à risque d'avoir des crises d'épilepsie;
- Vous souffrez d'alcoolisme;
- Vos battements cardiaques sont irréguliers;
- Vous prenez ou avez pris dans les 2 semaines précédentes un médicament inhibiteur de la monoamine oxydase (p. ex., sulfate de phénelzine, sulfate de tranlylcypromine, moclobémide ou sélégiline);
- Vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir, vous allaitez ou vous êtes en travail d'accouchement;
- Vous avez moins de 18 ans.

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser KADIAN, d'assurer l'utilisation adéquate du médicament et d'aider à éviter les effets secondaires. Informez votre professionnel de la santé de votre état actuel et de vos problèmes de santé, notamment :

- Vous avez des antécédents personnels ou familiaux d'abus d'alcool, de drogues illicites ou de médicaments sous ordonnance;
- Vous avez une maladie rénale, hépatique ou pulmonaire grave;
- Vous avez une maladie cardiaque;
- Votre pression sanguine est faible;
- Vous avez des antécédents de dépression ou êtes en dépression;
- Vous souffrez de constipation chronique ou grave;
- Vous avez des problèmes avec votre glande thyroïde, vos glandes surrénales ou votre prostate;
- Vous souffrez d'une maladie inflammatoire de l'intestin ou d'une maladie de la vésicule biliaire;
- Vous avez des problèmes avec votre pancréas;
- Vous avez subi récemment ou allez subir une opération;
- Vous avez ou avez eu dans le passé des hallucinations ou d'autres problèmes de santé mentale graves;
- Vous souffrez de migraines;
- Vous avez une maladie qui affecte le sang appelée drépanocytose.

Autres mises en garde :

Dépendance et toxicomanie aux opioïdes : Comme tout opioïde, KADIAN peut entraîner une dépendance physique et psychique; il présente également un risque d'abus et de toxicomanie. Il y a d'importantes différences entre la dépendance physique et la toxicomanie. Si vous utilisez des opioïdes pendant une longue période, vous pourriez développer une tolérance. Cela signifie que vous pourriez avoir besoin de doses plus élevées de KADIAN pour ressentir le même niveau de soulagement de la douleur. Il est important que vous parliez à votre professionnel de la santé si vous avez des questions ou des préoccupations sur l'abus de substances, la toxicomanie, la dépendance physique ou la tolérance. Votre professionnel de la santé doit prescrire KADIAN avec le même degré de prudence que pour les

autres médicaments opioïdes administrés par voie orale. L'utilisation de ces produits pendant une longue période n'est pas recommandée.

Grossesse, allaitement, travail et accouchement : N'utilisez pas KADIAN pendant la grossesse, l'allaitement, le travail et l'accouchement. Les opioïdes peuvent être transmis à votre bébé par le lait maternel ou alors qu'il est encore dans votre ventre. KADIAN peut causer des problèmes respiratoires mettant en danger la vie de votre enfant à naître ou de votre nourrisson allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Avant d'accomplir des tâches qui demandent une attention particulière, assurez-vous de savoir comment vous réagissez à la prise de KADIAN. KADIAN peut causer ce qui suit :

- somnolence,
- étourdissements ou
- sensation d'avoir la tête qui tourne.

Cela peut habituellement se produire lorsque vous prenez votre première dose ou lorsque la dose que vous prenez est augmentée.

Troubles des glandes surrénales : Vous pouvez développer un trouble des glandes surrénales appelé insuffisance surrénalienne. Cela signifie que vos glandes surrénales ne produisent pas une quantité suffisante de certaines hormones. Vous pouvez présenter des symptômes comme les suivants :

- nausée, vomissements,
- sensation d'être fatigué, faible ou étourdi,
- diminution de l'appétit.

Vous pouvez être plus susceptible d'avoir des problèmes de glandes surrénales si vous prenez des opioïdes depuis plus d'un mois. Votre professionnel de la santé peut faire des tests, vous donner un autre médicament et interrompre peu à peu votre traitement par KADIAN.

Toxicité sérotoninergique (aussi appelée *syndrome sérotoninergique*) : KADIAN peut causer une toxicité sérotoninergique, une affection rare, mais pouvant mettre la vie en danger. Elle peut entraîner de graves changements dans le fonctionnement de votre cerveau, de vos muscles et de votre appareil digestif. Vous pouvez développer une toxicité sérotoninergique si vous prenez KADIAN avec certains antidépresseurs ou antimigraineux.

Les symptômes d'une toxicité sérotoninergique comprennent les suivants :

- fièvre, transpiration, frissons, diarrhée, nausées, vomissements;
- tremblements, secousses, soubresauts ou raideur des muscles, réflexes hyperactifs et manque de coordination;
- battements de cœur rapides et changements de la pression artérielle;
- confusion, agitation, nervosité, hallucinations, modifications de l'humeur, perte de conscience et coma.

Fonction sexuelle/reproduction : L'utilisation prolongée d'opioïdes peut entraîner une diminution des taux d'hormones sexuelles. Elle peut aussi entraîner une baisse de la libido (le désir d'avoir des rapports sexuels), une dysfonction érectile ou une infertilité.

Apnée du sommeil : Les opioïdes peuvent causer un problème appelé *apnée du sommeil* (interruption momentanée de la respiration pendant le sommeil). Si vous avez des antécédents d'apnée du sommeil, ou si quelqu'un a remarqué que vous arrêtez de respirer de temps à autre pendant que vous dormez, mentionnez-le à votre professionnel de la santé.

Douleur aggravée : La prise d'opioïdes contre la douleur peut parfois avoir l'effet non recherché d'aggraver votre douleur (hyperalgésie induite par les opioïdes) même si votre dose d'opioïdes est restée inchangée ou a été augmentée. Cela peut aussi inclure des sensations de douleur à de nouveaux endroits sur votre corps ou des sensations de douleur en lien avec quelque chose qui ne ferait habituellement pas mal, par exemple, une douleur associée au contact des vêtements sur votre peau. Informez votre professionnel de la santé si vous observez un tel changement de votre douleur pendant votre traitement par KADIAN.

Troubles gastro-intestinaux : L'utilisation prolongée d'opioïdes peut entraîner des troubles de la gorge pouvant nuire à la déglutition. Ces effets apparaissent généralement dans les semaines ou les mois suivant le début du traitement par un médicament opioïde. Les symptômes courants comprennent des difficultés à avaler, des brûlures d'estomac et des douleurs thoraciques. Des complications gastro-intestinales graves peuvent également survenir, telles que des spasmes musculaires ou une obstruction de l'œsophage.

Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris : médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels ou produits de médecine parallèle.

Interactions médicamenteuses graves :

Les interactions médicamenteuses graves avec KADIAN comprennent :

- les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) utilisés pour traiter la dépression. Ne prenez pas KADIAN si vous prenez actuellement un IMAO ou si vous avez pris un IMAO dans les 14 jours précédant la prise de votre traitement par KADIAN;
- les benzodiazépines qui aident à dormir ou à réduire l'anxiété;
- les dépresseurs du système nerveux central (SNC) qui ralentissent le système nerveux, notamment :
 - d'autres opioïdes qui soulagent la douleur (p. ex., la méthadone, la pentazocine, et la buprénorphine);
 - les hypnotiques qui aident à dormir;
 - les antidépresseurs utilisés contre la dépression et les troubles de l'humeur (p. ex., la néfazodone, la trazodone, la buspirone, la vilazodone, la mirtazapine, le lithium); les antidépresseurs tricycliques tels que l'amoxapine et la maprotiline; les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline [IRSN] et les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine [ISRS], comme le dextrométhorphan, la linézolide, la cyclobenzaprine, le bleu de méthylène, le millepertuis et le tryptophane;
 - les anxiolytiques, les tranquillisants et les phénothiazines utilisés pour traiter les troubles mentaux ou affectifs;
 - les myorelaxants utilisés pour traiter les spasmes musculaires et les maux de dos (p. ex., le baclofène);
 - les anesthésiques généraux utilisés pendant une intervention chirurgicale;
 - les antipsychotiques et les neuroleptiques utilisés pour traiter les troubles mentaux (p. ex., la chlorpromazine);
 - les antihistaminiques utilisés pour soulager les symptômes d'allergies;

- les antiémétiques utilisés pour la prévention des nausées et des vomissements (p. ex., le granisétron, le dolasétron et l'ondansétron);
- les sédatifs pouvant accentuer la somnolence;
- la prégabaline, utilisée pour soulager la névralgie (douleur à un nerf);
- la gabapentine, utilisée pour prévenir et maîtriser les crises convulsives dans le cadre d'un traitement de l'épilepsie;
- les bêtabloquants utilisés pour réduire la tension artérielle;
- l'alcool, y compris les médicaments vendus avec ou sans ordonnance qui contiennent de l'alcool. Vous ne devez pas consommer d'alcool pendant que vous prenez KADIAN, car cela peut entraîner une somnolence, une respiration anormalement lente ou faible, des effets secondaires graves ou une surdose mortelle.

Les produits suivants pourraient également interagir avec KADIAN :

- les antimigraineux (agonistes 5-HT₁ aussi appelés triptans);
- les anticoagulants, utilisés pour fluidifier le sang et prévenir la formation de caillots (p. ex., warfarine);
- les médicaments antirétroviraux, antifongiques et les antibiotiques;
- les diurétiques;
- la cimétidine (utilisée pour traiter l'excès d'acide gastrique);
- la rifampicine (utilisée pour traiter les infections bactériennes).

Comment utiliser KADIAN :

Prendre KADIAN

- exactement comme il a été prescrit,
- généralement toutes les 24 heures, sauf indication contraire de votre professionnel de la santé.

KADIAN peut être avalé entier ou saupoudré sur de la compote de pomme ou du pudding.

Avalé :

- Avaler la capsule entière.
- Prendre la capsule avec un verre d'eau entier.
- Ne pas couper, briser, mâcher, dissoudre ou écraser la capsule - cela peut être dangereux et mettre la vie en danger.

Saupoudré :

- Mesurer une cuillerée à table de compote de pomme chaude ou froide (4° - 40 °C) ou de pudding à la température de la pièce.
- Ouvrir la capsule.
- Saupoudrer le contenu sur la cuillère à table.
- S'assurer que la capsule s'est vidée de tout son contenu.
- Avaler la cuillerée aussitôt que possible.
- Ne pas mâcher le contenu (granules).
- Se rincer la bouche et avaler l'eau utilisée pour rincer.

- Ne pas garder de mélange nourriture/médicament pour une prochaine dose.

Si vous ne vous rappelez pas à quel moment vous avez saupoudré le médicament sur de la compote de pomme ou du pudding ou sur quel aliment vous avez saupoudré le médicament, jeter le mélange nourriture/médicament.

Ne pas prendre de dose unique supérieure à 20 mg de KADIAN toutes les 24 heures à moins que vous n'ayez une « tolérance aux opioïdes ». Votre professionnel de la santé vous dira si vous avez une « tolérance aux opioïdes » jusqu'à une certaine dose de KADIAN.

KADIAN n'est pas recommandé pour administration rectale.

Dose habituelle :

La dose est déterminée au cas par cas. Veuillez suivre à la lettre les instructions posologiques de votre professionnel de la santé. N'augmentez pas ou ne diminuez pas la dose sans consulter votre professionnel de la santé. Prendre des doses plus élevées peut entraîner plus d'effets secondaires et un plus grand risque de surdose.

Évaluez votre douleur régulièrement avec votre professionnel de la santé pour déterminer si vous avez encore besoin de prendre KADIAN. Assurez-vous de n'utiliser KADIAN que pour l'affection pour laquelle il a été prescrit.

Si votre douleur augmente ou si vous développez tout autre problème de santé en prenant KADIAN, informez-en votre professionnel de la santé immédiatement.

Arrêter de prendre votre médicament :

Vous ne devez pas arrêter de prendre KADIAN d'un coup si vous l'avez pris pendant plus longtemps que quelques jours.

Votre professionnel de la santé vous surveillera et vous indiquera comment arrêter peu à peu de prendre KADIAN. Vous devez le faire peu à peu pour éviter des symptômes dérangeants comme les suivants :

- courbatures
- diarrhée
- chair de poule
- perte d'appétit
- nausées
- sentiment de nervosité ou d'agitation
- écoulement nasal
- éternuements
- tremblements ou frissons
- crampes d'estomac
- battements de cœur rapides (tachycardie)
- difficulté à dormir
- augmentation inhabituelle de la transpiration

- palpitations cardiaques
- fièvre inexpliquée
- faiblesse
- bâillements

En réduisant ou en arrêtant votre traitement par des opioïdes, votre corps deviendra moins habitué aux opioïdes. Si vous recommencez le traitement, vous devrez le faire à la dose la plus faible. Vous risquez une surdose si vous recommencez le traitement à la dose que vous preniez au moment où vous avez commencé à arrêter de prendre KADIAN peu à peu.

Renouvellement de l'ordonnance de KADIAN :

Votre professionnel de la santé doit rédiger une nouvelle ordonnance chaque fois que vous avez besoin d'un renouvellement de KADIAN. Par conséquent, veuillez à communiquer avec votre professionnel de la santé avant de ne plus avoir de médicament.

N'obtenez d'ordonnance de ce médicament qu'auprès du professionnel de la santé responsable de votre traitement. Ne cherchez pas à obtenir d'ordonnance auprès d'autres professionnels de la santé à moins que vous n'ayez changé de professionnel de la santé pour la prise en charge de votre douleur.

Surdose :

Les signes de surdosage peuvent comprendre les suivants :

- respiration inhabituellement lente
- étourdissements
- confusion
- somnolence extrême

Il est recommandé d'avoir de la naloxone à portée de main si vous prenez KADIAN. En cas de surdose, une autre personne devra vous administrer la naloxone. Elle devra appeler le 911 dès que possible et suivre les instructions fournies avec le produit de naloxone.

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez pris trop de KADIAN, contactez immédiatement votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital, votre centre antipoison régional ou le numéro sans frais de Santé Canada, 1-844 POISON-X (1-844-764-7669), même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Il est important que vous ne manquiez aucune dose. Si vous manquez une dose, prenez votre prochaine dose à l'heure où vous devez la prendre. Vous devez toujours essayer de respecter votre horaire de prise habituel (par exemple, à 8 heures du matin ou à 8 heures du soir). Si vous oubliez plusieurs doses de suite, discutez-en avec votre professionnel de la santé avant de recommencer votre traitement. Ne prenez pas deux doses en même temps pour compenser la dose manquée.

Effets secondaires possibles de l'utilisation KADIAN :

Voici certains des effets secondaires que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez KADIAN. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires peuvent comprendre les suivants :

- Confusion
- Constipation
- Étourdissements
- Somnolence
- Sensation d’avoir la tête qui tourne
- Insomnie
- Nausées, vomissements, manque d’appétit, bouche sèche
- Maux de tête
- Problèmes de vision
- Faiblesse (manque de force musculaire), manque de coordination des muscles
- Démangeaisons
- Transpiration
- Difficulté à uriner
- Manque de libido, impuissance (dysfonction érectile), infertilité

Discutez avec votre professionnel de la santé des façons de prévenir la constipation lorsque vous commencez à prendre KADIAN.

Effets secondaires graves et mesures à prendre à leur égard

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé		Obtenez immédiatement de l’aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
Rare			
Battements cardiaques rapides, lents ou irréguliers : palpitations cardiaques.		√	
Dépression respiratoire : Respiration lente, peu profonde ou faible.			√
Occlusion intestinale (fécalome) : Douleur abdominale, constipation sévère, nausées			√
Pression artérielle basse : étourdissements, évanouissement, sensation d’avoir la tête qui tourne.	√		
Réaction allergique : éruption cutanée (« rash »), urticaire, gonflement du visage, des lèvres,			√

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé		Obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
de la langue ou de la gorge, difficulté à avaler ou à respirer.			
Sevrage : nausées, vomissements, diarrhée, anxiété, frissons, peau moite et froide, courbatures, perte d'appétit, transpiration.		√	
Surdose : hallucinations, confusion, incapacité de marcher normalement, respiration lente ou faible, somnolence extrême, sédation ou étourdissements, muscles flasques ou manque de tonus musculaire, peau moite et froide.			√
Toxicité sérotoninergique (aussi appelée <i>syndrome sérotoninergique</i>) : réaction pouvant causer une sensation d'agitation ou de nervosité, des bouffées vasomotrices, des secousses musculaires, des mouvements involontaires des yeux, une transpiration abondante, une température corporelle élevée (> 38 °C) ou une rigidité musculaire.			√
Inconnu(e)			
Apnée du sommeil : arrêt de la respiration pendant de courtes périodes au cours d'une nuit normale de sommeil.		√	
Troubles de la glande surrénale : nausées, vomissements, anorexie, fatigue, faiblesse, étourdissements ou tension artérielle basse.		√	
Troubles gastro-intestinaux : difficultés à avaler, sensation que les aliments restent coincés dans la gorge ou dans la poitrine, douleurs	√		

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé		Obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
thoraciques, ou brûlures d'estomac.			

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- En consultant la page Web sur la déclaration des effets indésirables (Canada.ca/medicament-instrument-declaration) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courriel, ou par télécopieur; ou
- En téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

Remarque : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation :

- Conservez à la température ambiante (entre 15° et 25 °C). Conservez dans un endroit sec.
- Entreposez les capsules périmées ou inutilisées de KADIAN dans un lieu sûr afin de prévenir le vol, une mauvaise utilisation ou une exposition accidentelle.
- Gardez KADIAN sous clé, hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux.
- Ne prenez jamais de médicaments devant de jeunes enfants, car ils voudront vous imiter. L'ingestion accidentelle par un enfant est dangereuse et peut entraîner sa mort. Si un enfant prend accidentellement KADIAN, obtenez immédiatement une assistance d'urgence.

Mise au rebut :

Ne jetez jamais KADIAN dans les ordures ménagères, car des enfants ou des animaux pourraient y avoir accès. Veuillez rapporter les capsules périmées ou inutilisées à la pharmacie afin qu'elle en dispose adéquatement.

Pour en savoir plus sur KADIAN :

- Parlez-en avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patient-e-s. Ce document se trouve sur le

site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>) et sur le site Web du fabricant www.viatris.ca ou peut être obtenu en téléphonant au 1-844-596-9526.

Le présent feuillet a été rédigé par BGP Pharma ULC.

Date d'approbation : 2025-07-25

® Marque déposée de BGP Pharma ULC, Etobicoke (Ontario) M8Z 2S6