

### PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

Pr Mylan-Efavirenz  
(comprimés d'efavirenz)  
600 mg

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie d'une « monographie de produit » publiée à la suite de l'approbation de la vente au Canada de Mylan-Efavirenz et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de Mylan-Efavirenz. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

#### AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

##### À propos de Mylan-Efavirenz?

- Mylan-Efavirenz est la marque de commerce pour l'ingrédient actif efavirenz.
- Mylan-Efavirenz appartient à une classe de médicaments antirétroviraux (anti-VIH) connue sous le nom « d'inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse » (INNTI).

##### Les raisons d'utiliser ce médicament :

- Votre médecin vous a prescrit Mylan-Efavirenz parce que vous êtes infecté par le VIH. Mylan-Efavirenz doit toujours être pris en association avec d'autres médicaments antirétroviraux (souvent appelée « association médicamenteuse »).
- Pris en association avec d'autres médicaments antirétroviraux, l'efavirenz réduit la charge virale et augmente le nombre de lymphocytes CD4 (une forme de cellule immunitaire dans le sang). Il est possible que l'efavirenz ne produise pas ces effets chez tous les patients.

##### Est-ce que Mylan-Efavirenz guérit le VIH ou le SIDA?

- Mylan-Efavirenz ne guérit pas l'infection par le VIH ni le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). Les personnes qui prennent Mylan-Efavirenz peuvent continuer à présenter des infections ou d'autres maladies liées au VIH.
- Pendant votre traitement par Mylan-Efavirenz, il est important de demeurer sous les soins constants de votre médecin.

##### Est-ce que Mylan-Efavirenz réduit le risque de transmettre le VIH à d'autres personnes?

- Il n'a pas été démontré que Mylan-Efavirenz avait le potentiel de réduire le risque de transmettre le VIH lors de rapports sexuels ou de transfusions sanguines. Il importe de continuer la pratique des rapports sexuels protégés et d'éviter de partager des aiguilles souillées.

##### Les effets de ce médicament :

- Mylan-Efavirenz agit contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) en réduisant la quantité de virus présente dans le sang (appelée « charge virale »).

##### Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :

- Ne prenez pas Mylan-Efavirenz si vous êtes allergique à l'un ou l'autre des composants des comprimés Mylan-Efavirenz (voir « Les ingrédients non médicinaux sont : »).
- Mylan-Efavirenz ne doit pas être pris en concomitance avec certains médicaments identifiés dans ce dépliant (voir la rubrique « Médicaments pouvant interagir avec Mylan-Efavirenz »).

##### L'ingrédient médicinal :

L'efavirenz

##### Les ingrédients non médicinaux sont :

Les comprimés Mylan-Efavirenz contiennent 600 mg d'efavirenz et les ingrédients non médicinaux suivants : croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, laurylsulfate de sodium, cellulose hydroxypropyl, lactose monohydraté, et stéarate de magnésium. Le pelliculage contient : hypromellose, oxyde de fer rouge, oxyde de fer jaune, polyéthylène glycol et dioxyde de titane.

##### Les formes posologiques :

Chaque comprimé Mylan-Efavirenz contient 600 mg d'efavirenz.

#### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

##### **AVANT DE PRENDRE Mylan-Efavirenz**

##### Quels renseignements devrais-je fournir à mon médecin avant d'entamer mon traitement par Mylan-Efavirenz?

- Informer votre médecin de tout problème médical passé ou présent, notamment une maladie du foie, l'hépatite, des allergies, une insuffisance rénale grave, des convulsions ou une maladie mentale.
- Informez votre médecin si vous avez déjà présenté une réaction cutanée menaçante pour la vie (comme le syndrome de Stevens-Johnson).
- Informez votre médecin de toute médication (sur ordonnance et en vente libre), produit à base de plantes médicinales vitamine, supplément nutritionnel que vous prenez actuellement ou avez l'intention de prendre.
- Informez également votre médecin de toute drogue à usage récréatif (drogue de la rue, illicite) que vous prenez actuellement ou avez l'intention de prendre. L'effets de la consommation d'alcool ou d'une drogue à usage récréatif (drogue de la rue, illicite) pendant un traitement par l'efavirenz n'a fait l'objet d'aucune étude. Parce qu'il y a un risque d'interactions entre l'efavirenz et ces substances, consultez votre médecin ou un autre professionnel de la santé avant de les utiliser en association.

- Informez votre médecin si vous avez ou avez eu un trouble du rythme cardiaque, comme un rythme cardiaque irrégulier, un prolongement de l'intervalle QT ou des facteurs de risque de Torsade de Pointes (flottement dangereux du cœur).

#### Considérations relatives aux contraceptifs, à la grossesse et à l'allaitement

- Informez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous prévoyez le devenir. Des malformations congénitales graves ont été observées chez des animaux à naître et chez des bébés de femmes traitées par l'éfavirenz pendant la grossesse. On ignore si ces malformations sont attribuables à la prise d'éfavirenz. Les femmes ne doivent pas devenir enceinte pendant leur traitement par Mylan-Efavirenz ni pour 12 semaines après la fin du traitement. Si vous êtes enceinte, vous ne devez prendre Mylan-Efavirenz que si vous et votre médecin décidez que le bienfait escompté pour vous l'emporte sur le risque possible pour le fœtus. Si vous prenez Mylan-Efavirenz pendant que vous êtes enceinte, demandez à votre médecin comment vous inscrire au registre de femmes enceintes sous traitement antirétroviral
- Si vous allaitez ou avez l'intention d'allaiter votre bébé, informez-en votre médecin. Il n'est pas recommandé d'allaiter si vous êtes infectée par le VIH. Discutez-en avec votre médecin.
- Vous devez utiliser une méthode de contraception mécanique fiable en tout temps, même si vous ou votre partenaire utilisez d'autres méthodes contraceptives, dont les contraceptifs oraux (pilule) et les autres contraceptifs hormonaux (par exemple : implants, injections). Mylan-Efavirenz peut rester dans votre sang pendant un certain temps après l'arrêt du traitement. C'est pourquoi vous devez continuer à utiliser des mesures contraceptives fiables pendant 12 semaines après la fin de votre traitement par Mylan-Efavirenz.

#### Peut-on administrer Mylan-Efavirenz à des enfants?

- L'administration d'éfavirenz chez les enfants de moins de 3 ans n'a fait l'objet d'aucune étude.

Il est déconseillé de conduire un véhicule ou d'utiliser certains outils ou machines jusqu'à ce que vous ayez déterminé de quel façon vous répondez à la prise de Mylan-Efavirenz, car le médicament peut provoquer somnolence ou étourdissements.

La prise de Mylan-Efavirenz peut entraîner des résultats anormaux aux analyses sanguines. Votre médecin pourrait réaliser des analyses sanguines et en interprétera les résultats.

Pour savoir comment prendre Mylan-Efavirenz, veuillez lire attentivement la section « **PENDANT LA PRISE DE Mylan-Efavirenz** ».

### INTERACTIONS AVEC CE MÉDICAMENT

#### **Médicaments pouvant interagir avec Mylan-Efavirenz**

Mylan-Efavirenz peut interagir avec l'administration d'autres médicaments, y compris les médicaments pour traiter

l'infection par le VIH. Pour cette raison, il est très important :

- d'aviser tous les professionnels de la santé que vous prenez Mylan-Efavirenz;
- d'informer votre médecin ou pharmacien de tous les médicaments que vous prenez actuellement, y compris les médicaments offerts en vente libre, sans ordonnance, toute médication complémentaire (vitamines, suppléments nutritionnels, etc.) et tout produit à base d'herbes médicinales, surtout le millepertuis;
- de consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament;
- de consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de cesser de prendre un médicament que vous prenez actuellement.

Lors de vos visites chez le médecin, apportez tous vos médicaments avec vous. Ou encore, rédigez une liste comprenant le nom de chaque médicament, la dose que vous prenez et la fréquence à laquelle vous le prenez. Votre médecin aura alors un portrait global de votre régime thérapeutique. Il ou elle sera ainsi en mesure de décider de la meilleure approche en fonction de votre situation.

**Vous ne devez absolument pas prendre les médicaments suivants si vous prenez Mylan-Efavirenz. Prendre ces médicaments en même temps que Mylan-Efavirenz peut provoquer des effets secondaires qui pourraient être graves et (ou) mettre votre vie en danger :**

**CISAPRIDE\*<sup>z</sup>**

**MIDAZOLAM**

**TRIAZOLAM (p. ex. HALCION\*)**

**ALCALOÏDES DE L'ERGOT (p. ex. CAFERGOT\*)**

**PIMOZIDE (p. ex. ORAP\*)**

**ZEPATIER**

**ST. JOHN'S WORT (Hypericum perforatum)**

<sup>z</sup> La CISAPRIDE n'est pas commercialisée au Canada.

Vous ne devez pas prendre des produits médicinaux renfermant du millepertuis (*Hypericum perforatum*) lorsque vous prenez Mylan-Efavirenz puisque ces produits risquent d'entraver l'efficacité de Mylan-Efavirenz ou causer l'apparition d'une résistance à Mylan-Efavirenz ou aux agents de la classe des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI).

**Les médicaments suivants peuvent interagir avec Mylan-Efavirenz. Votre médecin déterminera si vous pouvez les prendre ou non et pourrait modifier la posologie de Mylan-Efavirenz ou des autres produits ou encore remplacer les autres produits, comme il est indiqué ci-dessous :**

- Mylan-Efavirenz peut être pris avec bon nombre de médicaments fréquemment administrés aux personnes infectées par le VIH, par exemple les inhibiteurs de la protéase (comme le nelfinavir [Viracept\*] et l'indinavir [Crixivan\*]), et les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI).

- L'utilisation de Mylan-Efavirenz avec le saquinavir (Invirase\*) n'est pas recommandée si le saquinavir est le seul inhibiteur de la protéase que vous prenez.
  - On ne doit pas avoir recours aux doses standard de **VORICONAZOLE (VFEND\*)** lorsque ce dernier est administré avec Mylan-Efavirenz parce que ceci peut rendre le voriconazole inefficace et augmenter les risques d'effets indésirables de l'éfavirenz. On peut prendre certaines doses de voriconazole simultanément à une dose plus faible de l'éfavirenz, mais votre médecin décidera si cela est approprié.
  - Si ce n'est pas la première fois que vous recevez un traitement contre l'infection au VIH, il peut être nécessaire de remplacer Tegretol\* (carbamazépine), Sporanox\* (itraconazole), Posanol\* (posaconazole) et REYATAZ (sulfate d'atazanavir) par un autre médicament, si vous prenez l'éfavirenz.
  - L'éfavirenz réduit les concentrations plasmatiques de la clarithromycine (Biaxin\*) et est associé à une incidence accrue de rash; votre médecin peut choisir de vous prescrire un autre antibiotique.
  - Si vous prenez Mylan-Efavirenz en association avec REYATAZ (sulfate d'atazanavir), vous devriez également prendre Norvir\* (ritonavir).
  - Les médicaments antipaludiques comme l'atovaquone et le proguanil, lorsqu'ils sont pris en concomitance avec Mylan-efavirenz, peuvent diminuer la quantité d'atovaquone/de proguanil dans votre sang, ce qui peut réduire l'activité antipaludique de ces médicaments. L'atovaquone et le proguanil ne doivent pas être pris en concomitance avec Mylan-Efavirenz; votre médecin doit envisager d'autres options thérapeutiques pour remplacer ces médicaments antipaludiques.
  - Les antibiotiques macrolides (ex. : la clarithromycine) et les médicaments antipaludiques (ex. : l'artéméter-luméfantine) comptent parmi les médicaments qui peuvent interagir avec l'éfavirenz de manière à affecter l'activité électrique de votre cœur.
  - L'utilisation d'EPCLISA (sofosbuvir/velpatasvir), de VOSEVI (sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprévir) et de MAVIRET (glécaprévir/pibrentasvir) n'est pas recommandée durant un traitement par Mylan-Efavirenz.
  - Mylan-Efavirenz peut interagir avec les implants contraceptifs à base d'etonogestrel, ce qui signifie que votre implant pourrait ne pas être efficace et que vous pourriez devenir enceinte. Vous devez utiliser une méthode contraceptive de barrière, comme le condom. Parlez à votre professionnel de la santé pour obtenir des conseils sur des méthodes contraceptives supplémentaires.
  - Votre médecin peut devoir adapter la dose de Mylan-Efavirenz ou des médicaments suivants, pris en concomitance :
    - Crixivan\* (indinavir)
    - Méthadone
    - Zoloft\* (sertraline)
    - Wellbutrin SR, Wellbutrin XL ou Zyban (bupropion)
    - Kaletra\* (lopinavir/ritonavir) L'association de lopinavir et de ritonavir ne doit pas être prise une fois par jour avec l'éfavirenz. Votre médecin pourrait vous suggérer une posologie de rechange.
    - Celsenti\* (maraviroc)
    - Mycobutin\* (rifabutine)
    - des médicaments qui abaissent le taux de cholestérol comme Lipitor\* (atorvastatine), Pravachol\* (pravastatine) et Zocor\* (simvastatine),
    - Rifadin\* (rifampine) ou tout médicaments contenant de la rifampine comme Rofact\* et Rifater\*,
    - des inhibiteurs calciques, tels que Cardizem\* ou Tiazac\* (diltiazem), Covera HS, Isoptin SR ou Tarka (vérapamil) et d'autres.
    - Immunosuppresseurs, tels que Neoral\* (cyclosporine), Advagraf\* ou Prograf\* (tacrolimus), Rapamune\* ou Torisel\* (sirolimus)
    - des agents antiviraux contre l'hépatite C
    - des antipaludiques comme Coartem\*♦ et Riamet\*♦ (artéméter/luméfantine)
- ♦ Non commercialisé au Canada
- Les effets d'une association de drogues euphorisantes (drogues illicites) ou d'alcool avec l'éfavirenz n'ont fait l'objet d'aucune étude. Puisque ces substances pourraient interagir entre elles, discutez-en avec votre médecin avant d'en consommer en concomitance avec l'éfavirenz.

## UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

### TRAITEMENT PAR Mylan-Efavirenz

#### Posologie habituelle

- La posologie recommandée chez les adultes et les enfants de plus de 40 kg (88 lb) est de 600 mg de Mylan-Efavirenz, une fois par jour (trois capsules de 200 mg OU 1 comprimé de 600 mg).
- Pour les enfants pesant 40 kg ou moins, la dose, administrée une fois par jour, est déterminée selon leur poids.
- Les capsules de Mylan-Efavirenz ne doivent être administrées que chez les enfants qui sont capables de les avaler.
- Il faut prendre Mylan-Efavirenz à jeun, de préférence au coucher. La prise de Mylan-Efavirenz en même temps que des aliments élève les concentrations d'éfavirenz dans le sang et peut accroître le risque de réactions indésirables.
- Votre médecin ou votre pharmacien vous indiquera la posologie appropriée.

### Le médicament suivant ne doit pas être pris avec Mylan-Efavirenz puisqu'il contient de l'éfavirenz, l'ingrédient actif de Mylan-Efavirenz :

- ATRIPLA (éfavirenz, emtricitabine, fumarate de ténofovir disoproxil) sauf si votre médecin juge qu'un ajustement de dose est nécessaire (p. ex. avec la rifampine).

### À faire et à ne pas faire pendant le traitement par Mylan-Efavirenz?

- Prenez Mylan-Efavirenz avec de l'eau.
- Ne croquez ni les capsules ni les comprimés.
- Les symptômes touchant le système nerveux peuvent être mieux tolérés lorsque Mylan-Efavirenz est pris au coucher.
- Il est important que vous preniez Mylan-Efavirenz comme le médecin vous l'a prescrit. Ne modifiez pas vous-même la dose.
- Mylan-Efavirenz ne devrait pas être employé seul pour traiter l'infection par le VIH. Il devrait toujours être administré en association avec d'autres agents antirétroviraux pour éviter que le virus ne devienne résistant au traitement médicamenteux.
- Vous ne devriez pas cesser de prendre Mylan-Efavirenz sans avoir consulté votre médecin au préalable.
- Si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez faire ou si vous avez besoin d'aide pour savoir quand il convient de prendre votre médicament, adressez-vous à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé.
- Si cela peut vous aider, demandez à un ami ou à un membre de votre famille de vous faire penser qu'il est temps de prendre vos médicaments.
- Si votre provision de Mylan-Efavirenz diminue, faites renouveler votre ordonnance par votre pharmacien ou votre médecin. Il est très important de ne jamais manquer de Mylan-Efavirenz, car votre charge virale pourrait augmenter si le traitement est interrompu, même pendant peu de temps; le virus peut alors devenir plus difficile à combattre.
- Rappelez-vous que Mylan-Efavirenz vous a été prescrit à vous seulement. Ne donnez jamais vos médicaments à d'autres personnes.
- Ne prenez pas Mylan-Efavirenz après la fin du mois et de l'année indiqués sur le flacon, sous la mention « date de péremption ».

#### Surdose :

En cas de surdose, communiquez avec un professionnel de la santé (p. ex. médecin), le service d'urgence d'un centre hospitalier ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

#### Dose oubliée :

- Si vous oubliez de prendre Mylan-Efavirenz, **ne doublez pas la dose suivante**. Prenez la dose que vous avez oubliée le plus tôt possible et continuez votre traitement comme d'habitude.
- Essayez de ne pas sauter de dose. Lorsque vous prenez un médicament anti-VIH, l'oubli d'une dose ou le non-respect de la posologie peuvent entraîner une augmentation de la concentration du virus dans l'organisme. Le VIH peut alors devenir résistant, ce qui signifie qu'il subit un changement ou une mutation qui rendent le médicament inefficace.

- Comme tous les médicaments, Mylan-Efavirenz entraîne des effets qui peuvent varier d'une personne à une autre. Tout médicament peut avoir des effets non voulus ou indésirables, appelés effets secondaires. Certains patients peuvent ressentir des effets secondaires, d'autres pas.
- Les effets secondaires les plus fréquents sont l'éruption cutanée et les symptômes neurologiques, comprenant les étourdissements, l'insomnie (difficulté à s'endormir), la somnolence, une capacité de concentration réduite, et des rêves anormaux. Ces effets secondaires sont généralement d'intensité légère à modérée et ont tendance à se résorber après quelques semaines de traitement par l'éfavirenz. Une réduction de la dose ne semble pas aider et n'est d'ailleurs pas recommandée.
- Certains de ces effets secondaires, comme les étourdissements, seront probablement moins évidents si vous prenez Mylan-Efavirenz au coucher. Assurez-vous d'aviser votre médecin de ces effets secondaires s'ils persistent ou s'ils vous incommode.
- Un petit nombre de patients ont manifesté une grave dépression, des pensées étranges ou un comportement colérique. Certains patients ont eu des idées suicidaires et quelques patients se sont suicidés. Ces problèmes semblent survenir plus souvent chez les patients qui ont déjà présenté des troubles mentaux. Informez immédiatement votre médecin si vous croyez que vous ressentez ces symptômes; votre médecin décidera si vous pouvez poursuivre votre traitement par l'éfavirenz.
- Étourdissements, troubles de la concentration et somnolence ont été signalés avec la prise d'éfavirenz. Si vous remarquez l'un ou l'autre de ces symptômes, vous devriez éviter les tâches pouvant s'avérer dangereuses comme conduire un véhicule ou opérer des outils ou des machines.
- Vous devriez consulter votre médecin si vous présentez une éruption cutanée, puisque certaines d'entre elles peuvent être graves. Toutefois, la majorité des cas d'éruption se résorbent sans modification à votre traitement.
- Les éruptions cutanées semblent être plus courantes chez les enfants que chez les adultes traités par l'éfavirenz.
- Des graves troubles hépatiques, y compris une insuffisance hépatique, évoluant dans certains cas vers un décès ou une greffe, sont survenus sous traitement par l'éfavirenz. La plupart des cas concernaient des patients déjà atteints d'une maladie hépatique chronique, cependant, il y a eu quelques cas de patients qui ne présentaient pas de maladie hépatique.
- Des changements pourraient survenir dans votre système immunitaire (syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire) lorsque vous commencerez à prendre des médicaments. Il se peut que votre système immunitaire se renforce et commence à combattre des infections à l'état latent dans votre organisme depuis longtemps. Une maladie auto-immune (lorsque le système immunitaire attaque des tissus sains de l'organisme) peut également survenir après le début de la prise des médicaments contre l'infection à VIH. En voici quelques exemples : la maladie de Basedow, le syndrome de Guillain-Barre, la

polymyosite et l'hépatite chronique active auto-immune. Les maladies auto-immunes peuvent survenir plusieurs mois après le début du traitement. Soyez à l'affût de tout symptôme comme :

- fièvre, rougeurs, éruptions cutanées ou enflure
- fatigue
- douleurs articulaires ou musculaires
- engourdissement ou faiblesse commençant dans les mains et les pieds et se déplaçant vers le tronc du corps
- palpitations (douleur thoracique) ou fréquence cardiaque élevée
- yeux globuleux, sensibilité à la lumière ou changements de la vision
- jaunissement de la peau
- difficulté à parler, à mastiquer ou à avaler

Si vous remarquez ces symptômes, consultez immédiatement votre médecin.

**Autres effets secondaires**

- Parmi les autres effets secondaires rapportés, on compte la fatigue, la nausée, la diarrhée et les maux de tête. Ces effets peuvent être attribuables à l'Éfavirenz ou aux autres médicaments que vous prenez.
- Informez votre médecin ou autre professionnel de la santé si vous remarquez ces symptômes ou tout autre effet indésirable non mentionné dans ce dépliant s'ils persistent ou s'ils vous incommode.

N'oubliez pas. Vous ne devez pas cesser de prendre Mylan-Efavirenz sans d'abord en discuter avec votre médecin. Il ou elle pourrait vous aider à gérer ces effets secondaires sans cesser la prise de vos médicaments anti-VIH.

<b>Peu fréquents</b>	<b>Grave éruption cutanée</b> <b>Symptômes :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formation de cloques ou desquamation de la peau</li> <li>• Formation de cloques ou desquamation de la bouche, des lèvres ou de la gorge</li> <li>• Fièvre accompagnée de malaise généralisé</li> </ul>			✓
<b>Rares</b>	<b>Hépatotoxicité</b> <b>Symptômes :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaunisse (couleur jaune de la peau ou du blanc des yeux)</li> <li>• Urine foncée</li> <li>• Décoloration des selles</li> <li>• Perte d'appétit pendant au moins plusieurs jours</li> <li>• Douleur au bas de l'estomac</li> <li>• Douleur au bas du ventre</li> </ul>		✓	

*Cette liste d'effets secondaires n'est pas exhaustive. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'effets secondaires inattendus pendant votre traitement par Mylan-Efavirenz.*

<b>EFFETS SECONDAIRES GRAVES, LEUR FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE.</b>				
Effets / Symptôme		Parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et sollicitez sans tarder des soins d'urgence
		Seulement dans les cas graves	Dans tous les cas	
<b>Fréquents</b>	<b>Troubles psychiatriques graves</b> <b>Symptômes :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dépression grave</li> <li>• Pensées suicidaires</li> <li>• Pensées étranges</li> <li>• Comportements agressifs</li> <li>• Catatonie (impossibilité de bouger ou de parler normalement)</li> </ul>		✓	

**COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT**

On doit conserver Mylan-Efavirenz entre 15°C et 30°C.

**Comme pour tout médicament, Mylan-Efavirenz devrait être gardé hors de la portée et de la vue des enfants.**

<p><b>Déclaration des effets secondaires</b></p> <p>Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d'être associés avec l'utilisation d'un produit de santé par:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<a href="https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada.html">https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada.html</a>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur ; ou</li> <li>• Téléphonant sans frais 1-866-234-2345.</li> </ul> <p><i>REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.</i></p>
---

**POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS**

**Pour en savoir davantage au sujet de Mylan-Efavirenz :**

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements pour les patients sur les médicaments. Ce document est publié sur le site Web de Santé Canada (<https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp>), ou en téléphonant le 1-844-596-9526.

Le présent dépliant a été rédigé par Mylan Pharmaceuticals ULC, Etobicoke, Ontario, M8Z 2S6.

Dernière révision : 15 février, 2021



Mylan Pharmaceuticals ULC  
Etobicoke, ON M8Z 2S6  
1-844-596-9526  
[www.mylan.ca](http://www.mylan.ca)

REYATAZ<sup>MD</sup> est une marque déposée de Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, utilisée sous licence par Bristol-Myers Squibb Canada.

PRAVACHOL<sup>MD</sup> est une marque déposée de Bristol-Myers Squibb Company utilisée sous licence par Bristol-Myers Squibb Canada

\* Les autres marques indiquées dans ce dépliant sont des marques de commerce de leur propriétaire respectif.